



Can your baby hear?



Your child's hearing can be tested at birth or any time thereafter by an audiologist who specializes in working with children. Undetected hearing loss in young children may cause significant communication and social difficulties. Early detection and education are vital! If your child has difficulty with the age-level hearing tasks listed below, you should seek professional assessment without delay.

0-3 months

Your baby should stir in sleep to a conversational voice. If awake, your baby should quiet to voice.

By 6 months

Your baby should rouse from sleep to loud sounds. Your baby should turn toward the direction of a sound.

By 9 months

Your child should enjoy playing with a bell or rattle and turn directly when called by name. Your child should be able to say several different sounds with changing pitch.

By 12 months

Your child should understand a variety of words: "no," "bye-bye," "hot," "doggie." Your child should begin to imitate some speech sounds. Your child should say two or three words, such as "da-da" or "ma-ma," spontaneously and at the right times.

By 18 months

Your child should follow simple commands: "Get your shoes," without cues. Your child should be saying more than six words.

By 2 years

Your child should be learning some new words every day. Your child should be using two- and three-word sentences.

By 3 years

Your child should use sentences of four or more words. Family members should be able to understand your child's speech.

By 4 years

Your child should speak in full sentences. People outside your family should be able to understand your child's speech.

**John
Tracy
Clinic**



Free worldwide services for parents of infants, toddlers and preschool children with hearing losses.

(800) 522-4582 • www.jtc.org

Your Doctor:



¿Puede oír su bebé?



Un audiólogo que se especializa en trabajar con los niños puede evaluar la audición de su hijo al nacer, o en cualquier momento después. El problema auditivo ignorado en los niños pequeños puede causar serias dificultades sociales y comunicativas. La detección e identificación temprana de una pérdida auditiva son cruciales. Si su hijo tiene dificultad con las habilidades a continuación, usted tiene que buscar una evaluación profesional de inmediato.

A los 3 meses

Su bebé debe moverse mientras duerme al oír una conversación. Si está despierto, debe aquietarse al oír la voz.

A los 6 meses

Su bebé debe despertarse al oír sonidos fuertes. Moverá su cabeza hacia la fuente del sonido.

A los 9 meses

Su bebé disfrutará al jugar con una campana o un sonajero. Voltará a mirar cuando le llamen por su nombre. Podrá decir varios sonidos con distintos tonos.

A los 12 meses

Su bebé entenderá una variedad de palabras: "no," "adiós," "perrito." Comenzará a imitar algunos sonidos del habla. Podrá decir dos o tres palabras, por ejemplo "pa-pa" o "ma-ma," espontáneamente y en el momento apropiado.

A los 18 meses

Su niño entenderá ordenes sencillas: "Trae tus zapatos," sin señas que le ayuden a entender. Podrá decir más de seis palabras.

A los 2 años

Su niño estará aprendiendo nuevas palabras cada día. Debe usar oraciones de dos o tres palabras.

A los 3 años

Su niño usará oraciones de cuatro o más palabras. Los miembros de la familia entenderán lo que él o ella dice.

A los 4 años

Su niño hablará en oraciones completas. Otras personas entenderán lo que dice.

**John
Tracy
Clinic**



Servicios gratuitos a nivel mundial para padres de niños con problemas auditivos entre nacimiento y cinco años de edad.

(800) 522-4582 • www.jtc.org

Su médico: